

TS – fiche 2 / fonction exponentielle


Exercice 1

Partie A

Voici deux courbes C_1 et C_2 qui donnent pour deux personnes P_1 et P_2 de corpulences différentes la concentration C d'alcool dans le sang (taux d'alcoolémie) en fonction du temps t après ingestion de la même quantité d'alcool.

L'instant $t = 0$ correspond au moment où les deux individus ingèrent l'alcool.

Définition : la corpulence est le nom scientifique correspondant au volume du corps.



- 1) La fonction C est définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ et on note C' sa fonction dérivée. À un instant t positif ou nul, la vitesse d'apparition d'alcool dans le sang est donnée par $C'(t)$.

À quel instant cette vitesse est-elle maximale ?

On dit souvent qu'une qu'une personne de faible corpulence subit plus vite les effets de l'alcool.

- 2) Sur le graphique précédent, identifier la courbe correspondant à la personne la plus corpulente. Justifier le choix effectué.
- 3) Une personne à jeun absorbe de l'alcool. On admet que la concentration C d'alcool dans son sang peut être modélisée par la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(t) = Ate^{-t}$
où A est une constante positive qui dépend de la corpulence et de la quantité d'alcool absorbée.

a/ On note f' la fonction dérivée de la fonction f . Déterminer $f'(0)$.

b/ L'affirmation suivante est-elle vraie ?

« À quantité d'alcool absorbée égale, plus A est grand, plus la personne est corpulente. »

Partie B

Paul, étudiant de 19 ans de corpulence moyenne et jeune conducteur, boit deux verres de rhum. La concentration C d'alcool dans son sang est modélisée en fonction du temps t , exprimé en heure, par la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(t) = 2te^{-t}$.

- 1) Étudier les variations de la fonction f sur $[0; +\infty[$.
- 2) À quel instant la concentration d'alcool dans le sang de Paul est-elle maximale ? Quelle est alors sa valeur ? Arrondir à 10^{-2} près.
- 3) Rappeler la limite de $\frac{e^t}{t}$ lorsque t tend vers $+\infty$ et en déduire celle de $f(t)$ en $+\infty$.
Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

4) Paul veut savoir au bout de combien de temps il peut prendre sa voiture. On rappelle que la législation autorise une concentration maximale d'alcool dans le sang de 0,2g/L pour un jeune conducteur.

a/ Démontrer qu'il existe deux nombres réels t_1 et t_2 tels que $f(t_1) = f(t_2) = 0,2$.

b/ Quelle durée minimale Paul doit-il attendre avant de pouvoir prendre le volant en toute légalité ?
Donner le résultat arrondi à la minute la plus proche.

5) La concentration minimale d'alcool détectable dans le sang est estimée à 5×10^{-3} g/L.

a/ Justifier qu'il existe un instant T à partir duquel la concentration d'alcool dans le sang n'est plus détectable.

b/ On donne l'algorithme suivant où f est la fonction définie par : $f(t) = 2te^{-t}$.

```

Initialisation :  t prend la valeur 3,5
                   p prend la valeur 0,25
                   C prend la valeur 0,21
Traitement :    Tant que  $C > 5 \times 10^{-3}$  faire :
                   | t prend la valeur t + p
                   | C prend la valeur f(t)
                   Fin Tant que
Sortie :        Afficher t
    
```

Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant en exécutant cet algorithme.
Arrondir les valeurs à 10^{-2} près.

	Initialisation	Étape 1	Étape 2
p	0,25		
t	3,5		
C	0,21		

Que représente la valeur affichée par cet algorithme ?

Exercice 2


Soient f et g les fonctions définies sur \mathbb{R} par : $f(x) = e^x$ et $g(x) = e^{-x}$.

On note C_f la courbe représentative de la fonction f et C_g celle de la fonction g dans un repère orthonormé du plan.

Pour tout réel a , on note M le point de C_f d'abscisse a et N le point de C_g d'abscisse a .

La tangente en M le point de C_f coupe l'axe des abscisses en P , la tangente en N à C_g coupe l'axe des abscisses en Q .

À l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, on a représenté la situation pour différentes valeurs de a et on a relevé dans un tableur la longueur du segment $[PQ]$ pour chacune de ces valeurs de a .



	A	B
1	Abscisse a	Longueur PQ
2	-3	2
3	-2,5	2
4	-2	2
5	-1,5	2
6	-1	2
7	-0,5	2
8	0	2
9	0,5	2
10	1	2
11	1,5	2
12	2	2
13	2,5	2
14		

Les questions 1 et 2 peuvent être traitées de manière indépendante.

- 1) Démontrer que la tangente en M à C_f est perpendiculaire à la tangente en N à C_g .
- 2) Que peut-on conjecturer pour la longueur PQ ?
Démontrer cette conjecture.

Exercice 3

Soit k un réel strictement positif. On considère les fonctions f_k définies sur \mathbb{R} par : $f_k(x) = x + ke^{-x}$.

On note C_k la courbe représentative de la fonction f_k dans un plan muni d'un repère orthonormé.

On a représenté ci-dessous quelques courbes C_k pour différentes valeurs de k .

